

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 20-9-89115148



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE  
ET DE LA FORÊT  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA  
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70




## EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 155 6  
du 12 Septembre 1989

=====  
: :  
: AGRUMES : Les cératites sont déjà là !! :  
: :  
: PINS : Premières sorties de larves en altitude :  
: :  
: VIGNE : Foyers de botrytis :  
: :  
=====

### AGRUMES

#### \*\* Cératite



Mouche méditerranéenne, femelle (d'après BONNEMAISON)

Cette mouche de 4,5 mm d'envergure et de 4 à 5 mm de long est redoutable. Les femelles pondent les oeufs dans les fruits. Les piqures entraînent des décolorations jaunes et les fruits "tournent" plus rapidement et tombent.

La cératite se manifeste sur tous les fruits d'été (abricots, pêches, poires) puis sur les kakis, enfin sur les agrumes.

Actuellement, les clémentines ne sont pas suffisamment attractives pour les cératites, elles commenceront à l'être lorsque les fruits vont commencer à tourner.

\*\* NE TRAITEZ PAS POUR LE MOMENT \*\*

P.1.7.4

Imprimerie de la Station de CASAMOZZA  
Directeur - Gérant : J.C. COQUET

à  
Abonnement Annuel :  
Régisseur de Recettes

Publication Périodique  
CPPAP N° 1769 - AD

ISSN  
C7 39 - 9633

### PINS

De très nombreuses larves L1 ont été déjà observées en forêt de VALDO NIELLO et forêt d'AITONE . Par contre, aucune sortie n'est visible sur VIZZAVONA ni dans les autres régions.

### VIGNE

Les foyers de botrytis se multiplient. Le temps couvert et chaud, les précipitations abondantes sont très favorables.

--> Si vous n'avez pas effectué de traitement anti botrytis pendant la saison, ne traitez pas. Un seul traitement réalisé maintenant n'aurait pas d'efficacité.

--> Si un traitement anti botrytis a déjà été réalisé (par exemple au début veraison). Vous pouvez envisager un dernier traitement. Son efficacité risque toutefois d'être limitée . Il devra avoir lieu **au moins trois semaines** avant les vendanges.

(C) SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1989 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.